



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



VIVA LA SOSTENIBILITÀ
NELLA VITIVINICOLTURA IN ITALIA

External Communication Report

Indicatore ACQUA di Organizzazione



Risultati dell'analisi dell'indicatore ACQUA di Organizzazione

AZIENDA: Azienda Agricola Caves Coopératives de Donnas

ANNO: 2023



1 INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
2	ANALISI DELL'INDICATORE ACQUA DI ORGANIZZAZIONE: FASI PRELIMINARI	4
2.1	RIFERIMENTI AZIENDALI	4
2.2	ATTESTATO DI CONFORMITA' ACA E CERTIFICAZIONE SQNPI.....	4
2.3	OBIETTIVO DELLO STUDIO	4
2.4	CONFINI DEL SISTEMA.....	4
2.5	UNITA' FUNZIONALE	4
2.6	PERIODO DI RIFERIMENTO	4
2.7	METODO DI CAMPIONAMENTO.....	5
3	ANALISI DELL'INDICATORE ACQUA DI ORGANIZZAZIONE: RISULTATI.....	6

1 INTRODUZIONE

L'analisi dell'Indicatore ACQUA di Organizzazione è finalizzata alla valutazione dei potenziali impatti di tipo quantitativo e qualitativo, dovuti rispettivamente al consumo e alla degradazione della qualità dell'acqua dolce utilizzata in fase di campo e di cantina, per le attività svolte nel corso dell'anno **2023**.

A tal scopo sono state selezionate due categorie d'impatto e i rispettivi indicatori a livello midpoint:

- **“Direct Water Scarcity Footprint”(Scarsità Idrica):** misura della carenza idrica potenziale dovuta ai consumi diretti di volumi d'acqua blu, valutata attraverso l'indicatore *“Direct Water Scarcity Footprint”* espresso in [$\text{m}^3 \text{H}_2\text{O}\text{-eq}/\text{anno}$]. I potenziali impatti sono calcolati con il metodo di caratterizzazione *AWARE (Available WATER REmaining)*, allo scopo di rispondere alla domanda: *“Qual è il potenziale di privare un altro utente (umano o ecosistema) di acqua disponibile quando si consuma acqua in quest'area?”*
- **“Non-comprehensive Direct Water Degradation Footprint” (Degradazione della qualità idrica):** fornisce una stima della potenziale degradazione dello stato di qualità delle acque, corrispondente al volume di acqua virtuale che permette di riportare sotto i limiti legislativi o eco-tossicologici l'eventuale contaminazione del corpo idrico dovuta ad agrofarmaci e fertilizzanti utilizzati nelle fasi agricole (applicazione dei trattamenti). L'indicatore di riferimento espresso in [$\text{m}^3 \text{H}_2\text{O}/\text{anno}$] è il *“Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint”*, più noto come *“acqua grigia di vigneto”*.

I potenziali impatti sulla scarsità idrica e degradazione della qualità delle acque, sono direttamente dipendenti dalle politiche aziendali di gestione della risorsa idrica. Questi sono influenzati rispettivamente dai consumi aziendali e dalle attività di campo, oltre che dalla localizzazione geografica e dalle caratteristiche sito specifiche in cui l'azienda opera.

Il calcolo dell'indicatore ACQUA di Organizzazione offre quindi una misura di quanto la totalità delle attività svolte dall'azienda nell'anno di riferimento influiscano sulla scarsità e degradazione delle risorse idriche.

Nel presente report si descrive l'applicazione dell'indicatore ACQUA di Organizzazione dell'azienda **Azienda Agricola Caves Coopératives de Donnas** per l'anno **2023**.

L'analisi dell'indicatore ACQUA di organizzazione è allineata allo standard UNI EN ISO 14046: 2016 ed è stata realizzata secondo la metodologia descritta nella pubblicazione di Lamastra et al (2014), che si rifà parzialmente all'approccio proposto da Hoekstra (2011).

2 ANALISI DELL'INDICATORE ACQUA DI ORGANIZZAZIONE: FASI PRELIMINARI

2.1 RIFERIMENTI AZIENDALI

DENOMINAZIONE AZIENDALE **Azienda Agricola Caves Coopératives de Donnas**
Referente Aziendale per la certificazione VIVA **Alessandro Jans**
Email **info@donnasvini.it**

2.2 ATTESTATO DI CONFORMITA' ACA E CERTIFICAZIONE SQNPI

L'azienda dichiara che:

Almeno il 50% della superficie dei vigneti che contribuiscono al prodotto in analisi dell'azienda singola o associata sono coperti dalla certificazione in merito alla conformità dell'intero processo produttivo alle norme tecniche previste nel disciplinare SQNPI

2.3 OBIETTIVO DELLO STUDIO

L'obiettivo del presente studio è la quantificazione dei potenziali impatti sulla quantità e qualità dell'acqua dolce conseguenti all'uso diretto di tale risorsa necessaria per le attività che l'azienda **Azienda Agricola Caves Coopératives de Donnas** ha svolto nel corso dell'anno **2023**.

2.4 CONFINI DEL SISTEMA

I confini del sistema del presente studio includono tutte le fasi che vanno dalla produzione in campo a quelle di cantina.

2.5 UNITA' FUNZIONALE

L'unità funzionale dello studio è una tenuta o diverse tenute situate nella stessa regione.
Azienda Agricola Caves Coopératives de Donnas

2.6 PERIODO DI RIFERIMENTO

I dati utilizzati per il calcolo dell'indicatore ACQUA di organizzazione fanno riferimento all'anno **2023**.

2.7 METODO DI CAMPIONAMENTO

Di seguito quanto dichiarato dall'azienda:

Si è proceduto identificando tutti i vigneti che forniscono l'uva alla cantina escludendo quelli i vigneti che contribuiscono a meno del 1% della produzione del prodotto oggetto d'analisi.

Tali vigneti sono stati classificati secondo tre caratteristiche critiche:

- **Pendenza del vigneto: >15%**
- **Vicinanza al corpo Idrico: <100 m**
- **Inerbimento del vigneto: < 50%**

Si sono distinti quindi i vigneti in 4 tipologie:

0. **Il vigneto non ha nessuna caratteristica critica;**
1. **Il vigneto ha 1 caratteristica critica delle 3;**
2. **Il vigneto ha 2 caratteristiche critiche su 3;**
3. **Il vigneto ha 3 caratteristiche critiche su 3.**

Il campionamento dei vigneti è stato effettuato calcolando la radice quadrata della superficie complessiva dei vigneti.

3 ANALISI DELL'INDICATORE ACQUA DI ORGANIZZAZIONE: RISULTATI


Il valore e i contributi percentuali delle scelte gestionali in campo e cantina sui valori di “Direct Water Scarcity (Scarsità idrica)” e “Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint TOTALI (Degradazione della qualità idrica)” calcolati con l'indicatore ACQUA di Organizzazione sono descritti in Tabella e in Figura 1.

L'indicatore ACQUA di Organizzazione è stato calcolato per l'intera organizzazione sulla base dei risultati dei vigneti rappresentativi, ponderati in funzione della loro estensione.

Tabella 1. Valutazione dell'indicatore Acqua dell'azienda **Azienda Agricola Caves Coopératives de Donnas (2023.)**

	m ³ H ₂ O-eq/anno	%
Direct Water Scarcity Footprint TOTALE	3,70E+02	
Vigneto (irrigazione)	0,00E+00	0,00%
Vigneto (trattamenti)	2,04E+02	55,21%
Cantina	1,66E+02	44,79%
Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint TOTALE	m³ H₂O/anno	%
Vigneto	1,50E+04	100%

Direct Water Scarcity Footprint (Scarsità idrica)



Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (Degradazione della qualità idrica)




Figura 1 Valori percentuali dei diversi contributi rispetto a “Direct Water Scarcity Footprint” e “Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint TOTALI” per l’azienda Azienda Agricola Caves Coopératives de Donnas.

Nella Tabella 2 sono riportati i dati in dettaglio dei siti di vinificazione e/o imbottigliamento.

Tabella 2. Dettaglio della Direct Water Scarcity Footprint di cantina

	m3 H2O -eq/anno	%	FC non-agri (m3-eq/m3)
Direct Water Scarcity Footprint Cantina	1,66E+02		
Via Roma, 97, 11020 Donnas AO, Italia	1,66E+02	100,00	1,15

Nella Tabella 3 sono riportati in dettaglio i valori dell'indicatore Acqua di Organizzazione per i singoli vigneti campionati.

Tabella 3. Dettaglio dell'indicatore Acqua calcolata per ogni vigneto esaminato

Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Barme C	0,00	0,93	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,07	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Boveroda 1	0,00	1,29	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,13	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-

Fattori di caratterizzazione (m³-eq/m³): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m ³ H ₂ O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m ³ H ₂ O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Boveroda 19	0,00	0,77	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,03	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m³-eq/m³): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m ³ H ₂ O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m ³ H ₂ O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Boveroda 21	0,00	1,45	1171,59
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,15	75,00	100	
Contaminante critico:	Spiroxamina	Inquinamento per:	Deriva
Fattori di caratterizzazione (m³-eq/m³): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			

Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Boveroda 7	0,00	1,22	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,12	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Boveroda 8	0,00	0,96	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,08	100,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto

Boveroda B	0,00	2,05	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,25	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Boveroda E	0,00	1,55	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,17	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Clapey C	0,00	1,49	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,16	75,00	100	

Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Gran Veugne 20	0,00	0,97	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,06	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Gran Veugne 5	0,00	1,13	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,10	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			

Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m ³ H ₂ O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m ³ H ₂ O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Gran Veugne B	0,00	0,70	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,04	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m³-eq/m³): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m ³ H ₂ O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m ³ H ₂ O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Gran Veugne C	0,00	1,61	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,18	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m³-eq/m³): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			

Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Gran Veugne D	0,00	0,63	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,03	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Grand Veugne E	0,00	0,70	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,04	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)

	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Iletta	0,00	0,82	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,06	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Iletta B	0,00	0,79	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,05	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Reisen 10	0,00	1,71	148,21
Dettaglio			

Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,19	75,00	100	
Contaminante critico:	Folpet	Inquinamento per:	Ruscellamento
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Reisen 11	0,00	1,33	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,13	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Reisen 13	0,00	1,05	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,09	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-

Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Reisen 14	0,00	0,83	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,06	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Reisen 15	0,00	0,68	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,03	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			

Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Reisen 16	0,00	0,88	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,07	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Reisen 22	0,00	1,49	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,16	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto

Reisen 23	0,00	0,79	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,05	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Reisen 4	0,00	1,31	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,13	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Reisen 9	0,00	1,86	1378,52
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,22	75,00	100	

Contaminante critico:	Spiroxamina	Inquinamento per:	Deriva
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Reisen A	0,00	1,02	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,09	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Reisen A2	0,00	0,76	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,05	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15

Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m ³ H ₂ O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m ³ H ₂ O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Ronc 2	0,00	0,88	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,06	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m ³ -eq/m ³): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerimento permanente			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m ³ H ₂ O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m ³ H ₂ O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Rondias 12	0,00	1,50	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,16	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m ³ -eq/m ³): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerimento permanente			

Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Rondias 24	0,00	1,43	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,15	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Rondias 25	0,00	1,00	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,08	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Rondias 3	0,00	1,77	0,00

Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,20	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Rovarey 6	0,00	0,93	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,07	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli antideriva e/o ad aspirazione d'aria (pressione max es 8 bar)			
Trattamento fila a bordo campo solo verso l'interno			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Rovarey C	0,00	1,05	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,09	75,00	100	

Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m³-eq/m³): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli antideriva e/o ad aspirazione d'aria (pressione max es 8 bar)			
Trattamento fila a bordo campo solo verso l'interno			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m ³ H ₂ O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m ³ H ₂ O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Rovarey E	0,00	1,11	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,10	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m³-eq/m³): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Trattamento fila a bordo campo solo verso l'interno			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m ³ H ₂ O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m ³ H ₂ O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Valley Guyet 18	0,00	2,63	703,23
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,34	75,00	100	
Contaminante critico:	Spiroxamina	Inquinamento per:	Deriva

Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Valley Guyet D	0,00	0,87	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,06	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			
Ugelli convenzionali			
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente			
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica			
Vigneto	Direct Water Scarcity Footprint (m3 H2O - eq/anno)		Non-Comprehensive Direct Water Degradation Footprint (m3 H2O/anno)
	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Vigneto
Valley Guyet E	0,00	0,48	0,00
Dettaglio			
Superficie (ha):	Resa (q/ha):	% in uso:	
0,00	75,00	100	
Contaminante critico:	-	Inquinamento per:	-
Fattori di caratterizzazione (m3-eq/m3): AGRI	2,89	NON AGRI	1,15
Mitigazioni			

Ugelli convenzionali
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente
Coltivazioni erbacee semi-naturali e erba medica

NOTE:



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

O P E R A



OPERA - Centro di ricerca per lo sviluppo sostenibile in agricoltura dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore